COVID19
Stratégie diagnostique

En vue d'une hospitalisation dans l'établissement : *via* les urgences
OU entrée directe : patient suspect COVID

En ES

Pneumopathie

OUI

- Oxygénothérapie nécessaire
- **OU** FR>22
- **OU** tirage
- **OU** présence de détresse respiratoire aigue
- **OU** immunodépression

NON → RT-PCR test rapide

- → Début des symptômes < 7j?
  - **OUI** → Hospitalisation secteur non COVID
  - **NON** → Angioscanner thoracique → Aspect compatible COVID?
    - **NON** → Hospitalisation secteur non COVID
    - **OUI** → Hospitalisation secteur COVID
- **+** → Hospitalisation secteur COVID

OUI → Angioscanner thoracique → Aspect compatible COVID?

- **OUI** → Hospitalisation secteur COVID
- **NON** → PCR test rapide
  - **+** → Hospitalisation secteur COVID
  - **-** → Hospitalisation secteur non COVID

NON

- Autre signe évocateur de COVID *(anosmie, troubles digestifs etc.)*

OUI → PCR test rapide

- **-** → Hospitalisation secteur non COVID
- **+** → Hospitalisation secteur COVID

NON → Test antigénique

- **-** →
  - Confusion, agitation, ivresse
  - **OU** Dément/déambulant
  - **OU** Handicap mental
  - **OU** Incapacité à garder un masque
  - **OUI** → PCR test rapide
  - **NON** → Hospit secteur non COVID
- **+** → Hospitalisation secteur COVID

Maintien strict des mesures barrières entre le dépistage et le rendu du résultat

24/11/2020